

Aide à la dispensation

SILDENAFIL – REVATIO 20mg

- PH
- PRS

Indications(s) :

Hypertension artérielle pulmonaire – HTAP idiopathique ou congénitale

Maladie :

Augmentation de la pression artérielle dans les artères pulmonaires (qui vont du cœur aux poumons). Entraînant une baisse de débit et un effort supplémentaire du cœur. Symptômes : essoufflement, oppression thoracique, gêne à l'effort

Administration :

Voie orale : 3 fois/j les comprimés doivent être pris toutes les 6 à 8 heures environ avec ou sans nourriture

Informations clés délivrance :

- Prescrit par médecin spécialiste en cardiologie, pneumologie ou médecine interne
- Si oubli prendre le comprimé oublié dès que possible, la dose suivante sera prise à l'heure habituelle, ne jamais doubler la dose
- Ne pas boire de jus de pamplemousse pendant la durée du traitement
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme de prise sans informer le médecin

Principaux effets indésirables :

- Maux de tête, douleurs musculaires, du dos--->paracétamol
- Vertiges, étourdissements--->levez-vous lentement
- Rougeur de la face--->réaction normale vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte
- Nausées/Inconfort digestif--->mangez lentement, évitez les repas trop riches
- Anomalies visuelles soudaines--->informez immédiatement le médecin
- Rhinite--->lavage du nez au sérum physiologique

A faire et à vérifier :

- Vérification médecin
- Vérification posologie avant dispensation

Conservation :

T° ambiante (< 25°C)

CO2KX : ANTIHYPERTENSEURS POUR L'HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE